

Errata

Schaefer/Spielmann/Vetter/Weber-Schöndorfer, Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit, 8. Aufl. 2012, Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag, ISBN 978-3-437-21203-1.

In der Tabelle „Orientierungshilfe zur Arzneimittelauswahl“ auf dem hinteren Buchumschlag und auf der Einlegekarte wurden bei drei Arzneimitteln falsche Angaben abgedruckt. Richtig müssen die Angaben folgendermaßen lauten:

Orientierungshilfe zur Arzneimittelauswahl

Arzneimittel	Embryonalperiode (SSW 1 - 12)	Fetalperiode (ab SSW 13)	Peripartalperiode	Stillzeit
Mebendazol	1	1	1	1
Metamizol	2	T	T	T
Methimazol	2	1	1	1

1	Mittel der 1. Wahl	Im Allgemeinen gut verträglich in der Schwangerschaft und Stillzeit. Auch diese Arzneimittel nur einsetzen, wenn ihre Anwendung einer nicht medikamentösen Therapie überlegen ist.
2	Mittel der 2. Wahl	Nur indiziert, wenn andere Therapiemöglichkeiten versagen. Oft unzureichende Erprobung während Schwangerschaft und Stillzeit.
T	Potenziell toxisch	Betrifft Embryo, Feten, Neugeborenes oder gestillten Säugling. Anwendung nur im begründeten Einzelfall. Bei Anwendung ggf. erweiterte pränatale Diagnostik (siehe entsprechendes Kapitel).

Sie können die korrekte Tabelle in Ihrem PIN-geschützten online-Angebot zum Buch auch jederzeit downloaden.

© Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag, Schaefer/Spielmann/Vetter/Weber-Schöndorfer,
Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit, 8. Aufl. 2012, ISBN 978-3-437-21203-1