

## Erratum

Tabelle 17.6, Seite 260

### Tab. 17-6 Antihypertensive Therapie bei Aortendissektion.

*Kombinationstherapie eines  $\beta$ -Blockers mit einem Vasodilatator:*

Therapiebeginn mit Esmolol:	500 $\mu\text{g}/\text{kg}$ Bolus i.v., anschließend 50 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ Ansteigende Infusion mit 25 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ alle 5 min bis zu einer Herzfrequenz von 60–80/min. Maximaldosis: 200 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ .
-----------------------------	--

Zugabe von Nitroprussid:	Infusionsbeginn mit 0,2 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ und titrierende Steigerung bis zum gewünschten Effekt (zur Nitroprussiddosierung $\gg$ Tab. 16-6).
--------------------------	--

*Monotherapie mit einem kombinierten  $\alpha$ -/ $\beta$ -Rezeptorantagonisten:*

Labetalol:	20 mg i.v. über 2 min, danach Infusion mit 1–2 mg/min bis zum gewünschten Effekt, dann Infusionsstopp. Maximaldosis: 300 mg.
------------	---